



NEUROLOGIA I PIEŁĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

MGR M. DZIURA

LEKI STOSOWANE W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

DO ZALICZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z NEUROLOGII I PIEŁĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO

Leki podawane drogą doustną

1. Metypred (Medrol, **Solu-Medrol**, Depo –medrol)

Wskazania- choroby wymagające ogólnoustrojowego lub miejscowego leczenia **glikokortykosteroidami**, takie jak zapalne i układowe choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, stany alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, ciężka postać astmy, odrzucenie przeszczepu

2. Trifas (Diured, Diuver, Torsemed)

Wskazania- **Obrzęki** związane z przewlekłą niewydolnością serca. Obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego lub nerkowego. Nadciśnienie tętnicze.

3. Ranopril (Diroto, Dironorm)

Wskazania-**nadciśnienie tętnicze**, objawowa niewydolności serca, u stabilnych hemodynamicznie chorych ze świeżym zawałem serca, w celu zapobiegania zaburzeniom czynności lewej komory i niewydolności serca – krótkoterminowe (6 tygodni) leczenie rozpoczęte w ciągu 24 godzin od wystąpienia zawału serca

4. Xarelto brak, inne **leki przeciw zakrzepowe** po konsultacji z lekarzem np. Acenokumarol

Wskazania- zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach, po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego, po przebytych udarach niedokrwiennych

5. Sulfasalazin (salazousulfapyridine)

Lek o działaniu przeciwzapalnym. Wskazania- Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zapalenie stawów kręgosłupa, w niektórych innych zapaleniach stawów, gdy leczenie innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi jest nieskuteczne

6. Nitrendypina (Nitresan)

Wskazania- Monoterapia i leczenie skojarzone **nadciśnienia tętniczego** samoistnego

7. Nebilenin Evibol, Ezocem, Nebicon

Wskazania-Zwalczanie samoistnego **nadciśnienia tętniczego**. Leczenie łagodnej i umiarkowanej stabilnej przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego jako leczenie dopełniające standardową kurację u pacjentów w starszym wieku- powyżej 70 roku życia.

8.Metocard (Betaloc, Beto)

Wskazania- **Nadciśnienie tętnicze**, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca

9.Hydrocortisonum

Lek o działaniu przeciwświądowym i przeciwzapalnym. Wskazania- Leczenie substytucyjne pierwotnej i wtórnej niedoczynności nadnerczy (choroby Addisona, po obustronnej adrenalectomii, po przewlekłej korytkoterapii i w czasie leczenia inhibitorami steroidogenezy, w przebiegu niedoczynności przysadki mózgowej).

10.Metronidazol Rozex

Wskazania- Leczenie **zakażeń bakteriami** beztlenowymi. Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym, spowodowanym bakteriami beztlenowymi. Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Bakteryjne zapalenie pochwy. Pełzakowica (ameboza) i lamblioza. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł, ostrych zakażeniach okołozębnych. Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi). W połączeniu z innymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem *Helicobacter pylori*

11.Mestinon

Wskazanie- **Miastenia** (nużliwość mięśni), porażenna niedrożność jelit, pooperacyjne zatrzymanie moczu

12.Pabi-Dexamethason Dexaven

Syntetyczny glikokortykosteroid, o bardzo silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Wskazania- Niedoczynność kory nadnerczy. Choroby autoimmunologiczne, czyli spowodowane skierowaniem się odporności organizmu przeciwko własnym tkankom m.in.: choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, liszaj rumieniowaty.

13.Baclofen (Lioresal)

Wskazania- W celu **zmniejszenia napięcia mięśniowego** w stwardnieniu rozsianym, po urazach i w chorobach rdzenia kręgowego.

14.Meprelon Metypred Solu-medrol

Wskazania- Schorzenia, które wymagają doustnego przyjmowania **glikokortykosteroidów**. W zależności od objawów i nasilenia należą do nich: zapalne i układowe choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, stany alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, ciężka postać astmy, okres po przeszczepie, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna, niewydolność kory nadnerczy po zakończeniu wzrostu.

15.Hygroton

Wskazanie- **Nadciśnienie tętnicze**. Łagodna do umiarkowanej, przewlekła, niestabilna niewydolność serca (klasa II lub III wg NYHA). Obrzęki w następstwie niewydolności krążenia, wodobrzusze spowodowane marskością wątroby u pacjentów pod ścisłą kontrolą, obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego. Moczówka nerkowa prosta.

16.Milurit Allupol

Wskazania- Pierwotna i wtórna **dna moczianowa**. Zawyżony poziom kwasu moczowego we krwi wywołany leczeniem radiologicznym lub chemioterapeutycznym białaczki i nowotworów. Nawracająca kamica szczawianowa.

17.Doxycyclinum (Efracea)

Pólsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracyklin. Wskazania- Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowo-płciowego, zakażenia przewodu pokarmowego, zakażenia skóry, zakażenia oczu. Ponadto borelioza wczesna, ziarniniak pachwinowy, listerioza, bruceloza, riketsjoza.

18.Encorton Lodota

Lek sterydowy. Wskazania- Zakres wskazań preparatu jest bardzo szeroki, stosuje się go między innymi w następujących dolegliwościach: zaburzenia endokrynologiczne (zapalenie gruczołu tarczowego); choroby reumatyczne, choroby skóry, choroby alergiczne, przewlekłe choroby przewodu pokarmowego - choroba Leśniowskiego i Crohna, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, choroby układu oddechowego choroby hematologiczne, choroby nowotworowe.

19.Acenocumarol Sintrom

Wskazania- Zapobieganie i leczenie powikłań **zakrzepowo-zatorowych**. W profilaktyce zakrzepicy po zabiegach operacyjnych, również po wszczępieniu protez naczyniowych i sztucznych zastawek serca, wrodzonym niedoborze antytrombiny III.

20.Beto 50 ZK Betaloc

Wskazania- **Nadciśnienie tętnicze**, choroba niedokrwienności serca. Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory. Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału. Profilaktyka migreny.

21.Biseptol Bactrim

Wskazania- stosowany jest w leczeniu **zakażeń** nerek i układu moczowego (ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego i cewki, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie gruczołu krokowego), zakażeń dróg oddechowych (ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc wywołane przez *Pneumocystis carinii*), zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych *Salmonellą* i *Shigellą*, zakażeń skóry.

22.Euthyrox letrox

Wskazania- Lek stosuje się w przypadku braku lub niedoboru naturalnych **hormonów tarczycy** (w niedoczynności tarczycy, w niektórych postaciach guzów tarczycy, w stanach po operacyjnym usunięciu tarczycy, w zapaleniu tarczycy). Wspomagająco w nadczynności tarczycy, w celu zahamowania nadmiernego powiększenia tarczycy (jednocześnie z lekami przeciwtarczycowymi).

23.Allupol Miluritt

Wskazania- Leczenie pacjentów z objawami pierwotnej lub wtórnej **dny** uwarunkowanej zwiększeniem stężenia kwasu moczowego/moczanów we krwi i w moczu (zapalenie stawów, kolka nerkowa). Leczenie pacjentów z wtórną hiperurykemią hiperurykemia - stan chorobowy charakteryzujący się podwyższonym poziomem kwasu moczowego we krwi) występującą podczas chemioterapii i radioterapii nowotworów. Lek ma również zastosowanie w leczeniu nawracającej kamicy moczanej, w zespole Lesch-Nyhana.

24.Letrox Euthyrox

Wskazania- Terapia zastępcza i uzupełniająca w **niedoczynności tarczycy** różnego pochodzenia. Zapobieganie wznowieniu wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy. Leczenie wola obojętnego. Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

25.Tegretol (Finlepsin) Amizepam

Wskazania- **Padaczka**. Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym). Alkoholowy zespół abstynencyjny. Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego. Nieswoisty nerwoból nerwu językowo-gardłowego.

26.Nimotop

Wskazania- Doustna kontynuacja profilaktyki i leczenia niedokrwienych **ubytków neurologicznych** spowodowanych skurczem naczyń krwionośnych mózgu po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka.

27.Madopar Belapar

Wskazania- Leczenie **parkinsonizmu**. Leczenie zespołu niespokojnych nóg.

28.Depakine Convulex Absenor

Wskazania- **Padaczka**. Profilaktyka choroby afektywnej dwubiegunowej w przypadku nieskuteczności preparatów litu, karbamazepiny.

29.Amitriptylinum

Wskazania- Leczenie objawów **depresji**, a zwłaszcza stanów, w których pacjent wymaga uspokojenia.

30.Pernazinum

Wskazania – leczenie ostrej i przewlekłej **schizofrenii**, ostrych zaburzeń psychicznych z omamami, urojeniami, lękami, utratą poczucia osobowości, katatonii, manii, pobudzenia psychomotorycznego.

31.Bioxetin

Wskazania - leczenie epizodów dużej **depresji**, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz bulimii (jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia chęci objadania się i zwracania spożytych pokarmów).

32.Anafranil

Wskazania- leczenie :

- stanów **depresyjnych** o różnym pochodzeniu i objawach (endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postacie depresji oraz depresje związane ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości)
- zespołów depresyjnych związanych z podeszłym wiekiem, w przebiegu przewlekłych stanów bólowych i przewlekłych chorób somatycznych
- zespołów natręctw
- fobii i napadów lęku.

U dzieci i młodzieży po 5. roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego (po wykluczeniu przyczyn organicznych).

33.Nitrazepam GSK

Wskazania w przypadku ciężkiej **bezsensowności** charakteryzującej się trudnościami w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami, pogarszającej w znacznym stopniu jakość życia chorego oraz narażającej go na silny stres, gdy możliwa jest sedacja w ciągu dnia.

34.Tiapridal

Wskazania- w leczeniu pobudzenia **psychomotorycznego** i zachowań agresywnych u osób w podeszłym wieku z demencją.

35.Oksazepam

Wskazania do stosowania w **doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych** towarzyszących nerwicom oraz innym zaburzeniom psychosomatycznym, zaburzeń snu o podłożu czynnościowym. Stany napięcia i niepokoju związane z trudnościami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania preparatu.

36.Sirdalud

Wskazania - **bolesne skurcze mięśni związane ze statycznymi i czynnościowymi chorobami kręgosłupa** (zespoły szyjne i lędźwiowe) lub w następstwie operacji, np. z powodu przepukliny jądra miazdżystego lub zapalenia stawu biodrowego; zwiększone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne, np. stwardnienie rozsiane, przewlekłe choroby rdzenia kręgowego, choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, udar naczyniowy mózgu oraz porażenie mózgowe.

37.Alpragen

Wskazania - stosuje się przez krótki okres w leczeniu ciężkich **zaburzeń lękowych**.

38.Kwetaplex

Wskazania - **leczenie schizofrenii**, choroby dwubiegunowej, w tym: leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej, leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, zapobieganie nawrotom choroby dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

39.Sertagen

Wskazania – leczenie epizodów dużej **depresji** (w tym także depresji z objawami lęku), a także w zapobieganiu ich nawrotom, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia, leczenie zespołu stresu pourazowego.

40.Pramolan

Wskazania leczenie **zaburzeń lękowych** uogólnionych i zaburzeń lękowych pod postacią somatyczną (objawiający się fizycznymi dolegliwościami).

41.Heminevrin

Wskazania - stany **niepokoju**, pobudzenia i splątania oraz zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym. Ostre stany abstynencji poalkoholowej, majaczenie alkoholowe.

42.Chlorprothixen

Wskazania – **leczenie psychoz endogennych** i organicznych ze stanami pobudzenia ruchowego i agresją, niepokoju oraz bezsenności w nerwicach i zaburzeniach psychosomatycznych, psychoz alkoholowych, stosowany w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi, w celu uspokojenia chorego i zmniejszenia reakcji neurovegetatywnych oraz w celu zapobiegania wymiotom pooperacyjnym.

43.Bemecor

Wskazania - **migotanie przedsionków** z szybką czynnością komór, w przebiegu niewydolności serca.

44.Prestarium

Wskazania – **leczenie nadciśnienia tętniczego**, objawowej niewydolności serca (to wskazanie dotyczy wyłącznie preparatu Prestarium 5 mg), stabilnej choroby niedokrwiennej serca – w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowych u chorych z zawałem serca i/lub rewaskularyzacją naczyń wieńcowych w wywiadzie.

45. Betaserc (Histigen)

Wskazania - stosowanie w chorobie **Ménière'a** (która charakteryzuje się: zawrotami głowy z nudnościami i wymiotami, postępującą utratą słuchu i szumami usznymi), w objawowym leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

46. Isoptin

Wskazania – leczenie **nadciśnienia tętniczego**, choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej), w tym stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej, dławicy naczynioskurczowej (Prinzmetal) oraz dławicy piersiowej po zawale serca bez niewydolności serca (gdy nie jest wskazane stosowanie beta-blokerów), zaburzeń rytmu serca, w tym napadowego częstoskurczu nadkomorowego, migotania lub trzepotania przedsionków z szybką czynnością komór, z wyjątkiem zespołu WPW lub LGL.

47. Tertensif (Diuresin)

Wskazania - leczenie **samoistnego nadciśnienia tętniczego** u osób, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane za pomocą monoterapii peryndoprylem.

48. Oxycardil

Wskazania- leczenie stabilnej, niestabilnej i naczynioskurczowej (postać Prinzmetal) **dławicy piersiowej** oraz nadciśnienia tętniczego.

49. Preductal

Wskazania - długotrwałe leczenie choroby **niedokrwiennej serca** - zapobieganie napadom dławicy piersiowej. Leczenie wspomagające zaburzeń ślimakowo-przedsionkowych wywołanych niedokrwieniem, takich jak zawroty głowy, szumy uszne, niedosłuch.

50. Plavix

Wskazania - profilaktyka **przeciwwzakrzepowa** w objawowej miażdżycy: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwinnym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych; u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym lub z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

51. Topamax

Wskazania – w różnych postaciach **padaczki** jako jedyny lek lub jako uzupełniający skojarzony z innymi lekami przeciwpadaczkowymi; profilaktyka migreny

52. Acard

Wskazania - w chorobie **niedokrwiennej serca** oraz w takich sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób z grupy dużego ryzyka, świeży zawał serca lub jego podejrzenie, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytych zawałach serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwinnego udaru mózgu u pacjentów z TIA, u osób z TIA po przebytych udarach niedokrwinnym mózgu, choroba zastośowa miażdżycy tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u osób z licznymi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żyłnej i zatorowości płuc u osób długotrwałe unieruchomionych (np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki).

53. Agapurin (Polfilin)

Wskazania - **Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego lub tętniczo-żylnego** pochodzenia miażdżycowego, cukrzycowego, zapalnego; miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym, choroba Bürgera, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenie podudzi, zgorzel). Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (siatkówki lub naczyńki). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu, zaburzenia równowagi). Zaburzenia ukrwienia mózgu: stany po udarze mózgu, upośledzenie koncentracji i pamięci, zaburzenia snu, bóle głowy)

54. Amlopin

Wskazania - **nadciśnienie tętnicze**, profilaktyka stabilnej lub naczynioskurczowej (Prinzmetal) duszniczy bolesnej. Amlodypina może być stosowana w skojarzeniu z diuretykami, β -blokerami, ACE-inhibitorami, azotanami lub nitrogliceryną. Lek nie jest wskazany do leczenia ostrych ataków duszniczy bolesnej.

55. Avedol

Wskazania - **nadciśnienie tętnicze**, niewydolność serca, choroba wieńcowa (choroba niedokrwienności serca).

56. Anesteloc (Controloc)

Wskazania - **Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy**, choroba refluksowa przełyku oraz zapobieganie jej nawrotom, zespół Zollingera i Ellisona. Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem niewybiórczych niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób z grup zwiększonego ryzyka wymagających długotrwałego stosowania tych leków.

57. Asamax

Wskazania - **wrzodziejące zapalenie jelita grubego** o przebiegu łagodnym do umiarkowanego

58. Acidum folcium Hasco

Wskazania - **uzupełnienie codziennej diety w kwas foliowy**. Polecany szczególnie wszystkim kobietom planującym macierzyństwo i w pierwszych miesiącach ciąży oraz kobietom stosującym hormonalną antykoncepcję, osobom starszym, palącym papierosy.

59. Diclac

Wskazania- Leczenie objawowe: **reumatoidalnego zapalenia stawów**, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, bólu, bolesnego miesiączkowania.

60. Deflegmin

Wskazania- **Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych** przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania gęstej, nadmiernie lepkiej wydzieliny oskrzelowej, np. ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego zaostrzenia, astmatyczne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, rozszerzenie światła oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie zatok obocznych nosa, w okresie przed- i pooperacyjnym w celu uniknięcia powikłań ze strony układu oddechowego (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), tzw. kaszel "mokry".

61. Clemastinum

Wskazania - tabletki i syrop - **objawowe leczenie alergicznego nieżytu nosa** (katar, kichanie, świąd, łzawienie), łagodzenie objawów alergii skórnej (pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk naczynioruchowy).

62. Captopril

Wskazania - **Nadciśnienie tętnicze** różnego pochodzenia. Ponadto jako lek wspomagający w przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

63. Concor

Wskazania - **Nadciśnienie tętnicze**. Choroba niedokrwienności serca.

64. Cilan (Inhibace)

Wskazania - leczenie **nadciśnienia tętniczego** i przewlekłej niewydolności serca.

65. Diaprel

Wskazania- Leczenie **cukrzycy niezależnej od insuliny** (cukrzyca typu 2), gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą diety, aktywności fizycznej i zmniejszenia masy ciała.

66. Calcium Dobesilate Hasco

Wskazania- Naczyniowe choroby oczu wywołane długotrwałą cukrzycą, nadciśnieniem, żylaki kończyn dolnych, żylaki odbytu, zapalenie żył, owrzodzenie podudzi, obrzęki kończyn dolnych.

67. Furosemidum

Wskazania - **Obrzęki**, będące objawem chorób układu krążenia (zastoinowa niewydolność serca), wątroby i nerek (w tym marskość wątroby i zespół nerczycowy). Nadciśnienie tętnicze, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie.

68. Hydrochlorothiazidum

Wskazania - **Obrzęki** w zastoinowej niewydolności serca, marskości wątroby, zaburzeniach czynności nerek. Nadciśnienie tętnicze.

69. Enarenal

Wskazania - **Nadciśnienie tętnicze**, niewydolność serca.

70. Effox long (Mononit)

Wskazania - **Leczenie choroby niedokrwiennej serca** o przebiegu przewlekłym, zapobieganie napadom dławicy piersiowej oraz leczenie niektórych postaci przewlekłej niewydolności krążenia.

71. Pabi-naproxen

Wskazania - **Reumatoidalne zapalenie stawów**, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie kości i stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów. Ostre stany zapalne narządu ruchu, jak zapalenie kałek maziowych, zapalenie pochewek ścięgnistych. Ostry napad dny moczanowej. Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, w tym bóle pooperacyjne, pourazowe i inne; bóle mięśni, kości, stawów, ból głowy, również migrenowy, bóle zębów, nerwobóle. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka różnego pochodzenia, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

72. Kalipoz

Wskazania - **stany prowadzące do nadmiernej utraty jonów potasowych** (w przebiegu długotrwałych biegunek, niektórych chorób nerek, cukrzycy). Zapobiegawczo w przypadkach leczenia glikozydami naparstnicy, kortykosteroidami oraz lekami moczopędnymi.

73. Nifuroksazyd

Wskazania - **ostra biegunka bakteryjna** bez objawów zakażenia ogólnego (biegunka podróżnych, biegunka pokarmowa, zapalenie żołądka i jelit).

74. Metoclopramid

Wskazania – **zaburzenia czynności ruchowej przewodu pokarmowego**, refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, wymioty różnego pochodzenia, niewydolność wpustu żołądka, zaparcia wynikające ze słabej perystaltyki jelita grubego, atonia

żołądka (zanik prawidłowego napięcia lub fizjologicznych skurczów mięśni gładkich), zaburzenia perystaltyki jelit po operacjach jamy brzusznej, jako lek pomocniczy w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w diagnostyce przewodu pokarmowego. Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworów

75. Polprazol (Omeprazol)

Wskazania- **choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy**, eradykacja zakażenia *Helicobacter pylori* u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, refluks żołądkowo-przełykowy (objawowy refluks żołądkowo-przełykowy, refluksowe zapalenie przełyku), leczenie czynnościowej dyspepsji, zespół Zollinger-Ellisona.

76. Tulip (Torvacard, Zocor, Sortis, Simvasteryl)

Wskazania - stosowany jest przy **nadmiarze cholesterolu** (hipocholesterolemii) oraz tłuszczów (hiperlipidemii) we krwi, jeśli inne metody (zmiana diety, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie przynoszą pożądanych rezultatów.

77. Siofor (Metformax)

Wskazania - **leczenie cukrzycy** typu 2 u dorosłych, szczególnie u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

78. Loperamid WZF

Wskazania - objawowe leczenie **biegunki ostrej** i przewlekłej różnego pochodzenia (z wyjątkiem biegunek bakteryjnych).

79. Tritace (Vivace, Piramil, Axtil)

Wskazania - **nadciśnienie tętnicze** - w monoterapii (leczenie pojedynczym lekiem) i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie. Zastoinowa niewydolność serca. Niewydolność serca po przebytych zawałach mięśnia sercowego - w celu zmniejszenia śmiertelności pozawałowej. Zmniejszanie ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych; u chorych na cukrzycę, u których istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie tętnicze, duże stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie cholesterolu frakcji HDL (tzw. "dobrego cholesterolu"), palenie tytoniu, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Ponadto niecukrzycowe schorzenia kłębuszków nerkowych szczególnie ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.

80. Theovent

Wskazania - stany przebiegające ze zwężeniem **dróg oddechowych** (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, stany zapalne oskrzeli z odczynem spastycznym i inne).

81. Spironol

Wskazania - **hiperaldosteronizm pierwotny** (leczenie przedoperacyjne chorych z gruczolakiem lub przewlekłe u pacjentów z obustronnym przerostem kory nadnerczy) i wtórny. Obrzęki pochodzenia sercowego, wątrobowego i nerkowego. Nadciśnienie tętnicze (leczenie skojarzone - leczenie kilkoma lekami). Hipokaliemia (obniżony poziom potasu we krwi) w przypadku braku możliwości zastosowania innych metod leczenia. Zaawansowana niewydolność serca w skojarzeniu z innymi lekami.

82. Paracetamol

Wskazania - **Gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy**. Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu: ból głowy, ból zębów (również związany z bolesnym ząbkowaniem), bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

